

Institution:

ALABAMA DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH

Isoniazida, Tableta oral

¿Qué es este medicamento?

La ISONIAZIDA se utiliza para tratar o prevenir la tuberculosis.

Este medicamento puede ser utilizado para otros usos; si tiene alguna pregunta consulte con su proveedor de atención médica o con su farmacéutico.

¿Qué le debo informar a mi profesional de la salud antes de tomar este medicamento?

Necesita saber si usted presenta alguno de los siguientes problemas o situaciones:

- diabetes
- VIH positivo
- si consume bebidas con alcohol con frecuencia
- enfermedad renal
- enfermedad hepática
- malnutrición
- hormigueo en los dedos de la mano o del pie u otros trastornos nerviosos
- una reacción alérgica o inusual a la isoniazida, a otros medicamentos, alimentos, colorantes o conservantes
- si está embarazada o buscando quedar embarazada
- si está amamantando a un bebé

¿Cómo debo utilizar este medicamento?

Tome este medicamento por vía oral con un vaso de agua. Siga las instrucciones de la etiqueta del medicamento. Tome este medicamento con el estómago vacío, por lo menos 30 minutos antes o 2 horas después de las comidas. No lo tome con alimentos. Tome sus dosis a intervalos regulares. No tome su medicamento con una frecuencia mayor a la indicada. Para asegurarse de que su terapia funcione de la mejor manera posible, asegúrese de tomar cada dosis exactamente como le hayan indicado. No omita ninguna dosis o suspenda el uso de su medicamento aun si se siente mejor. Si omite dosis la TB puede hacerse resistente a este medicamento y otros medicamentos. No deje de tomarlo excepto si así lo indica su médico.

Hable con su pediatra para informarse acerca del uso de este medicamento en niños. Puede requerir atención especial.

Sobredosis: Póngase en contacto inmediatamente con un centro toxicológico o una sala de urgencia si usted cree que haya tomado demasiado medicamento.

ATENCIÓN: Este medicamento es solo para usted. No comparta este medicamento con nadie.

¿Qué sucede si me olvido de una dosis?

Si olvida una dosis, tómela lo antes posible. Si es casi la hora de la próxima dosis, tome sólo esa dosis. No tome dosis adicionales o dobles.

¿Qué puede interactuar con este medicamento?

No tome esta medicina con ninguno de los siguientes medicamentos:

- entacapona
- té verde
- levodopa
- IMAOs, tales como Carbex, Eldepryl, Marplan, Nardil y Parnate
- procarbazina
- ranolazina
- tolcapona

Esta medicina también puede interactuar con los siguientes medicamentos:

- acetaminofeno
- alcohol
- antiácidos
- medicamentos para la diabetes
- medicamentos para infecciones micóticas, tales como quetoconazol e itraconazol
- medicamentos para convulsiones, tales como carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, ácido valproico
- teofilina

- zalcitabina

Puede ser que esta lista no menciona todas las posibles interacciones. Informe a su profesional de la salud de todos los productos a base de hierbas, medicamentos de venta libre o suplementos nutritivos que esté tomando. Si usted fuma, consume bebidas alcohólicas o si utiliza drogas ilegales, indíquese también a su profesional de la salud. Algunas sustancias pueden interactuar con su medicamento.

¿Qué efectos secundarios puedo tener al utilizar este medicamento?

Efectos secundarios que debe informar a su médico o a su profesional de la salud tan pronto como sea posible:

- reacciones alérgicas como erupción cutánea, picazón o urticarias, hinchazón de la cara, labios o lengua
- problemas respiratorios
- cambios en la visión o dolor de los ojos
- orina oscura
- fiebre, dolor de garganta
- alucinaciones, pérdida del contacto con la realidad
- pérdida del apetito
- problemas de la memoria
- náuseas, vómito
- hormigueo, dolor, entumecimiento de manos o pies
- enrojecimiento, formación de ampollas, descamación o distensión de la piel, inclusive dentro de la boca
- convulsiones
- dolor estomacal
- cansancio o debilidad inusual
- color amarillento de los ojos o la piel

Efectos secundarios que, por lo general, no requieren atención médica (debe informarlos a su médico o a su profesional de la salud si persisten o si son molestos):

- agrandamiento o sensibilidad de los pechos
- diarrea
- dolor de cabeza
- malestar estomacal
- dificultad para conciliar el sueño

Puede ser que esta lista no menciona todos los posibles efectos secundarios. Comuníquese a su médico por asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Usted puede informar los efectos secundarios a la FDA por teléfono al 1-800-FDA-1088.

¿A qué debo estar atento al usar este medicamento?

Visite a su médico o a su profesional de la salud para chequeos periódicos. Necesitará realizarse análisis de sangre regularmente.

Tal vez necesita tomar suplementos de vitaminas mientras está tomando este medicamento. Consulte a su médico acerca de los alimentos y vitaminas que toman. Evite tomar los antiácidos 2 horas antes y después de tomar una dosis de este medicamento.

El alcohol puede interferir con el efecto de este medicamento. Evite consumir bebidas alcohólicas.

Si es diabético, controle su nivel de azúcar en la sangre como le haya indicado. Además, podrá obtener un resultado positivo falso en los análisis de determinación del nivel de azúcar en la orina. Consulte con su médico.

¿Dónde debo guardar mi medicina?

Manténgala fuera del alcance de los niños.

Guárdela a temperatura ambiente, entre 15 y 30 grados C (59 y 86 grados F). Protéjala de la luz. Mantenga el envase bien cerrado. Deseche todo el medicamento que no haya utilizado, después de la fecha de vencimiento.

ATENCIÓN: Este folleto es un resumen. Puede ser que no cubra toda la posible información. Si usted tiene preguntas acerca de esta medicina, consulte con su médico, su farmacéutico o su profesional de la salud.